玉名地域トマト防除暦　【R8】

※薬剤使用前には再度、安全使用基準を包装容器のラベル等で確認の上、自己責任において使用して下さい。

玉名地方農業普及指導協議会野菜部会

農薬登録情報は令和8年6月現在



基幹的防除（育苗期）

	鉢上げ		接ぎ木～定植前まで			定植直後	定植時
IRAC分類	4A	6	5	6	28	28	4A
殺虫剤	ベストガード粒剤	アファーム乳剤	スピノエース顆粒水和剤	コロマイト乳剤	ベリマークSC	（ベリマークSC）	スタークル粒剤
希釈倍数	1～2g/株	2000倍	5000倍	1500倍	400倍 25ml/株	800倍 50ml/株	1～2g/株
コナジラミ類	●	●		●	●	●	●
トマトサビダニ		●		●			
	● ※2g/株	●	●	●	●	●	●
アザミウマ類			●		●	●	
ハスモンヨトウ							
オオタバコガ		●	●				
アブラムシ類	●				●	●	● ※1g
トマトキバガ		●			●	●	
マルハナバチ影響						1日	

(いずれか1回)

※健苗育成のためホスプラスを施用

FRAC分類			M4	M1			
殺菌剤			オーソサイド水和剤80	Zボルドー			
希釈倍数			800～1200倍	400～600倍			
疫病			●	●			
灰色かび			● ※800倍				
葉かび			● ※800倍				
すすかび			● ※800倍	● ※500倍			
斑点病							
うどんこ病							

基幹的防除（本圃）

栽培終盤でもコナジラミ類・トマトキバガの防除を十分に行い、ハウス内で増やさない対策を徹底しましょう！

	9月	10月				11月			12月			1月		
	下	上旬	中旬	下旬		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
IRAC分類	6	5	4A	9B	11A	5	28	6	23	30	6	11A	21A 16	
殺虫剤	アグリメック	ダブルシューターSE	モスピラン顆粒水溶剤	コルト顆粒水和剤	ゼンターリ顆粒水和剤	ディアナSC	ベネビアOD	アニキ乳剤	クリアザールフロアブル	グレーシア乳剤	アファーム乳剤	エスマルクDF	アプロードエースフロアブル	サフオイル乳剤
希釈倍数	500～1000倍	1000倍	2000倍	4000倍	1000倍	2500～5000倍	2000～4000倍	1000～2000倍	2000～4000倍	2000倍	2000倍	1000倍	1000～2000倍	300～500倍
コナジラミ類	●	●	●	●		● ※2500倍	● ※2000倍	●	●	●	●		●	●
トマトサビダニ	●							● ※2000倍	● ※2000倍	●	●		● ※1000倍	● 300倍
ハモグリバエ類	● ※トマト	●				●	● ※2000倍	● ※2000倍		●	●			
アザミウマ類	●	●	●			●	● ※2000倍	● ※ミカンキイロ		●				
ハスモンヨトウ					●	●		● ※2000倍		●		● ※ヨトウムシ		
オオタバコガ		●			●	●	●	● ※2000倍		●	●	●		
アブラムシ類			●	●			● ※2000倍							●
トマトキバガ	●	●			●	●	● ※2000倍	● ※1000倍		●	●	●		
マルハナバチ影響	7日	3日	3日	7日		3日	1日	1日	1日	1日	2日	1日	1日	1日

	2月				3月			4月			5月			6月			
	上旬		中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬		中旬	下旬
IRAC分類	34	11A		23	5	6	9B	30	28	4A	6	29	28	4C	UN	23	6
殺虫剤	ファインセーブ	エスマルクDF	サフオイル乳剤	クリアザールフロアブル	ディアナSC	アファーム乳剤	チェス顆粒水和剤	グレーシア乳剤	ベネビアOD	モスピラン顆粒水溶剤	アファーム乳剤	ウララDF	ベネビアOD	トランスフォームフロアブル	プレオフロアブル	モベントフロアブル	アグリメック
希釈倍数	1000～2000倍	1000倍	300～500倍	2000～4000倍	2500～5000倍	2000倍	5000倍	2000倍	2000～4000倍	2000倍	2000倍	2000～4000倍	2000～4000倍	1000～2000倍	1000倍	2000倍	500～1000倍
コナジラミ類	●		●	●	● ※2500倍	●	●	●	● ※2000倍	●	●	● ※2000倍	● ※2000倍	●		●	●
トマトサビダニ	● ※1000～4000倍		● 300倍	● ※2000倍		●		●			●			●		●	●
ハモグリバエ類					●	●		●	● ※2000倍		●		● ※2000倍		●		● ※トマト
アザミウマ類	●				●			●	● ※2000倍	●		● ※ミカンキイロ 2000倍	● ※2000倍			●	●
ハスモンヨトウ		● ※ヨトウムシ			●			●							●		
オオタバコガ		●			●	●		●	●		●		●		●		
アブラムシ類			●				●		● ※2000倍	●		●	● ※2000倍	● ※2000倍		●	
トマトキバガ		●			●	●		●	● 2000倍		●		● 2000倍		●		●
マルハナバチ影響	1日	1日	1日	1日	3日	2日	1日	1日	1日	3日	2日	1日	1日	放飼中は×	1日	30日	7日

FRAC分類			M4		M1		40 M5	17 12	40	27 M5	45 40	M7	7	9
殺菌剤			オーソサイド水和剤80		サンヨール（乳）		プロポーズ顆粒水和剤	ジャストミート顆粒水和剤	レーバスフロアブル	ブリザード水和剤	ザンプロDMフロアブル	ベルクートフロアブル	カンタスドライフロアブル	フルピカフロアブル
希釈倍数			800～1200倍		500～700倍		1000～1500倍	2000～3000倍	1000～1500倍	1200～2000倍	1500倍	2000～4000倍	1000～1500倍	2000～3000倍
疫病			●				●		●	●	●			
灰色かび			● ※800倍		● ※500倍			●				●	●	●
葉かび			● ※800倍		● ※500倍		● ※1000倍			● ※1200倍		●	●	
すすかび			● ※800倍							● ※1200倍		●		
斑点病														
うどんこ病					●							●		

FRAC分類	27 11	7	2	21	10 1	12	10 2	9	M7	27 11	17			
殺菌剤	ホライズンドライフロアブル	アフェットフロアブル	ロブラール水和剤	ランマンフロアブル	ゲッター水和剤	セイビアーフロアブル20	スミブレンド水和剤	フルピカフロアブル	ベルクートフロアブル	ホライズンドライフロアブル	ピクシオDF			
希釈倍数	1500～2500倍	2000～4000倍	1000～1500倍	1000～2000倍	1000～1500倍	1000～1500倍	2000倍	2000～3000倍	2000～4000倍	1500～2500倍	2000倍			
疫病	●			●						●				
灰色かび		● ※2000倍	●		●	●	●	●	●		●			
葉かび	● ※2500倍	● ※2000倍			●				●	● ※2500倍				
すすかび		● ※2000倍							●					
斑点病			● ※1000倍			● ※1000倍								
うどんこ病		●							●					

ボトキラーの定期的散布

ボトキラー ダクト内投入

サフオイル乳剤・ベミデタッチの定期的散布